

## Supositorio de Thiomucase da EVOL

É indicado para celulite e obesidade (promove a reabsorção da gordura acumulada na derme), hidropexia, hidrolipopexias generalizadas ou localizadas, perturbações tróficas, pós-flebites e pós-traumáticos, edemas por obstruções linfática e venosa, cicatrizes, queloides, agente de difusão de medicamentos. Em traumatologia, como coadjuvante da mobilização articular, nos casos de periartrite e artrose. Como tratamento auxiliar do lumbago e torcicolo. Pode ser útil associar pequenas doses de diuréticos para favorecer a eliminação da água liberada ao nível dos tecidos. Como a Thiomucase não tem efeito sobre o componente gorduroso da afecção, é essencial prescrever ao mesmo tempo um regime de restrição calórica, cada vez que uma sobrecarga lipídica é associada à essa retenção de água. Síndrome pré-menstrual.

**Embalagem com 30 capsulas em cada embalagem com aproximadamente 4 g cada capsula, tratamento para um mês.**

A Thiomucase é uma enzima mucopolissacaridase. É extraída do testículo dos bovinos onde a ação principal é a diminuição da viscosidade da substância fundamental do tecido conjuntivo. Sua propriedade essencial é a despolimerização dos mucopolissacarídeos, corpos bioquímicos complexos, que entram na constituição da substância fundamental do tecido conjuntivo, e regulam, em grande parte, a distribuição de água nesses tecidos. Os mucopolissacarídeos podem formar um gel de viscosidade elevada que se constitui num obstáculo aos fenômenos vitais de difusão e intercâmbios celulares. A Thiomucase não tem efeito sobre o componente gorduroso, porém pode atuar na terapêutica da obesidade facilitando o intercâmbio extracelular com o adipócito, diminuindo a viscosidade inter-celular, facilitando a drenagem linfática, fator comprometido na gênese da celulite., e também facilitando a difusão de medicamentos. Enfim, a Thiomucase com sua ação mucopolissacaridase facilita a permeabilidade tecidual do tecido gorduroso, desta forma tendo indicação para seu uso na obesidade.

Thiomucase, é uma enzima de difusão (mucopolissacaridase), isolada dos mesmos tecidos que contém hialuronidase. Tem ação mais eletiva sobre o ácido condroitin sulfúrico, outro componente do cimento intercelular, juntamente com o ácido hialurônico. Sua propriedade essencial é a despolimerização de mucopolissacarídeos, corpos bioquímicos complexos que entram na constituição da substância fundamental do tecido conjuntivo e regula, em grande parte, a distribuição de água nesse tecido.

Quanto mais elevado o grau de polimerização dos mucopolissacarídeos, maior será a capacidade de retenção de água pela substância fundamental.

A água retida irá se ligar aos mucopolissacarídeos formando um gel de viscosidade elevada que se constitui num obstáculo aos fenômenos vitais de difusão e intercâmbios celulares. A Thiomucase é indicada como agente terapêutico específico em afecções caracterizadas por uma hiperpolimerização dos mucopolissacarídeos, hidropexia e síndrome pré-menstrual, Ou como auxiliar terapêutico para favorecer a difusão de Substâncias medicamentosas no

organismo. A associação com hialuronidase, enzima que despolimeriza somente o ácido hialurônico, aumenta seu potencial de ação.

**Atenção:**

Para qualquer tipo de tratamento procure sempre a orientação de especialistas habilitados, de confiança, e evite problemas futuros, não faça do seu corpo um laboratório, você será o(a) maior prejudicado(a).

**Cada capsula contém:**

Drágeas contendo 25 UTR de mucopolissacaridase

Creme contendo 13.500 UTR de mucopolissacaridase por 100g de creme

Supositório contendo 1000 UTR (atividade condroitinásica) e 4000 unidades (atividade hialuronidásica)

**Posologia:**

Deve-se inserir uma hora antes de dormir. O tratamento dura de 90 dias a 6 meses. Para manter a consistência do Supositório de Thiomucase é necessário conservá-lo em geladeira.

Síndrome pré-menstrual, geralmente tratada com Thiomucase supositórios, são nas doses indicadas para cada forma durante os 10 dias que precedem a data da menstruação. O médico responsável permanece com o poder de decisão das doses a serem aplicadas (associação ou alternância das formas de Thiomucase, de acordo com as indicações e o desenvolvimento da doença).

**Modo de usar:**

As cápsulas devem ser abertas cortadas com tesoura cuidadosamente após estarem condicionadas em geladeira para que o supositório mantenha sua consistência.

**Contra indicação:**

Pessoas que apresentem doenças de alterações fisiológicas, mulheres grávidas ou amamentando deverão consulta o médico antes de usar o produto. Pessoas alérgicas a uva devem evitar o consumo deste produto. O consumo de Resveratrol auxilia na manutenção de níveis saudáveis do seu organismo, desde que associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis.

Incontinência fecal.

Não há maiores referências de contra-indicação.

**Efeitos adversos:**

Incontinência fecal. Ainda não foram relatados efeitos adversos importantes da thiomucase em literaturas analisadas.